

専門試験

科目名：011. 数理科学

(注意) 複数の設問がある場合、解答は、設問(ローマ数字のI, II, ……)ごとに別の解答用紙を用いること。
ただし、設問の中で解答用紙に関して別途指定がある場合は、それに従うこと。

問題は全部で4問あり2枚に記されている。I, II(1枚目)及びIII, IV(2枚目)はいずれも必答問題である。合計4問に日本語で解答しなさい。

次のI, II(1枚目), III, IV(2枚目)の全てに解答しなさい。

I. N を正の整数とする。 N 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & N & N-1 & \cdots & 3 & 2 \\ 2 & 1 & N & \cdots & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & \cdots & 5 & 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ N-1 & N-2 & N-3 & \cdots & 1 & N \\ N & N-1 & N-2 & \cdots & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

を考える。すなわち A の (i, j) 成分を a_{ij} で表すと、 $i \geq j$ のときには $a_{ij} = i - j + 1$ 、 $i < j$ のときには $a_{ij} = i - j + 1 + N$ で定められている。このとき、以下の問に答えよ。

(1) 第1成分が1であるような A の固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \\ \vdots \\ a^{N-2} \\ a^{N-1} \end{pmatrix}$$

のような形で与えられることが知られている。そのような複素数 a が満たすべき条件を求めよ。

(2) A の固有値を求めよ。

II. $\mathbb{R}$ の開区間 I 上の実数値関数 f が凸である、すなわち f は

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y), \quad x, y \in I, \quad \theta \in [0, 1]$$

を満たすとする。このとき、以下の問に答えよ。

(1) f は I 上連続であることを示せ。

(2) 任意の $x \in I$ に対し、 f の x における右側微分 $f'_+(x)$ 、左側微分 $f'_-(x)$ がそれぞれ存在し、 $f'_-(x) \leq f'_+(x)$ となることを示せ。

令和9年度 第1回 京都大学大学院人間・環境学研究科 修士課程入学試験問題

専門試験

科目名：011. 数理科学

(注意) 複数の設問がある場合、解答は、設問（ローマ数字のI、II……）ごとに別の解答用紙を用いること。
ただし、設問の中で解答用紙に関して別途指定がある場合は、それに従うこと。

III. $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ を正則関数とする. また $0 < \alpha < 1$ とする. このとき, 以下の問に答えよ.

- (1) 関数項級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(n^{\alpha} f\left(\frac{1}{n}z\right) - n^{\alpha} f(0) - f'(0)n^{\alpha-1}z \right)$ が $\mathbb{C}$ 上収束することを示せ.
- (2) $g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(n^{\alpha} f\left(\frac{1}{n}z\right) - n^{\alpha} f(0) - f'(0)n^{\alpha-1}z \right)$ ($z \in \mathbb{C}$) とおくとき, 関数 g は $\mathbb{C}$ 上正則であることを示せ.
- (3) (2) で与えられた g が定数関数であるとする. このとき, ある $a, b \in \mathbb{C}$ によって

$$f(z) = az + b \quad (z \in \mathbb{C})$$

となることを示せ.

IV. $\lambda > 0$, $x \in \mathbb{R}$ に対して, $G_{\lambda}(x)$ を

$$G_{\lambda}(x) = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} (4\pi t)^{-1/2} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right) dt$$

で定める. このとき, 以下の問に答えよ.

- (1) $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ における $\lambda G_{\lambda}(x) - G_{\lambda}''(x)$ を計算せよ.
- (2) $\int_{-\infty}^{\infty} G_{\lambda}(x) dx$ を計算せよ.
- (3) $f \in C_0(\mathbb{R})$, すなわち f は $\mathbb{R}$ 上の連続関数で, コンパクトな台をもつものとする. $\lambda > 0$, $x \in \mathbb{R}$ に対して, $(G_{\lambda} * f)(x)$ を

$$(G_{\lambda} * f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} G_{\lambda}(x-y)f(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} G_{\lambda}(z)f(x-z) dz$$

で定める. このとき,

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \|\lambda G_{\lambda} * f - f\|_{L^1(\mathbb{R})} = 0$$

が成立することを示せ. ただし, $\|\cdot\|_{L^1(\mathbb{R})}$ は $L^1(\mathbb{R})$ のノルムである.